

Características morfológicas de las tenias que infectan a humanos

	<i>Taenia solium</i>	<i>Taenia saginata</i>	<i>Taenia asiatica</i>
Cuerpo entero Largo (m) Ancho (mm) Proglótidos (número)	1-5 7-10 700-1 000	4-12 12-14 1 000-1 500	1-8 9-12 200-1 200
Escólex Diámetro (mm) Ventosas (número) Rostelo Ganchos (número)	0.6-1.0 4 Presente 22-32	1.5-2.0 4 Ausente Ausentes	0.2-2.0 4 Presente, chico Vestigial***
Proglótidos maduros Testículos (número) Ovario (Nº de lóbulos) Esfínter de la vagina Largo (mm) Ancho (mm)	350-600 3 Ausente 2.1-2.5 2.8-3.5	800-1 200 2 Presente 2.1-4.5 3.1-6.7	300-1 200 2 Presente NR NR
Proglótidos grávidos Útero (número de ramas)	7-11	14-32	12-26
Protuberancia posterior Largo (mm) Ancho (mm)	Ausente 3.1-10 3.8-8.7	Presente 10-20 6.5-9.5	Presente 4-22 3-12
Cisticerco Tamaño (mm) Fluido vesicular (ml) Ganchos en el escólex	8-15* <0.5** Presentes	6-10 NR Ausentes	0.4-3.5 NR Rudimentarios
Huevo Tamaño (micras) Ganchos (número)	26-34 6	26-34 6	16-45 6

* En el ser humano el cisticerco tipo racemoso mide hasta 20 cm.

** En el ser humano el cisticerco tipo racemoso contiene hasta 60 ml.

*** Los ganchos están hundidos y son rudimentarios.

NR, no reportado.