

Algunas características diferenciales de los blátidos domésticos

Especies	Aspecto general	Dimorfismo sexual	Número de huevos en ooteca	Duración del ciclo	Sobrevida	Distribución geográfica
<i>Blatella germanica</i>	Pequeña (10–15 mm), color café amarillento con dos bandas oscuras en pronoto	Hembras más oscuras con alas que cubren todo el abdomen. Machos claros, alas dejan abdomen descubierto	37 – 44	1 mes	90 – 100 días	Cosmopolita
<i>Blatta orientalis</i>	Tamaño intermedio (20–27 mm), color café oscuro, caoba	Hembras casi ápteras, machos con alas que cubren 2/3 abdomen	16 – 18	2 años	35 – 180 días	Países templados. En Sudamérica: Chile, Argentina, Sur de Brasil
<i>Periplaneta americana</i>	Grande (35-40 mm), color café parduzco	Hembras y machos con alas que cubren todo el abdomen	16	1–3 años	100 días	Cosmopolita
<i>Periplaneta australasiae</i>	Tamaño intermedio (23–27 mm) de color café claro con manchas claras en el borde exterior del par de alas	Hembra y macho con alas que cubren todo el abdomen	22 – 24	1 año	¿?	Regiones tropicales y subtropicales