

Principales parasitosis productoras de anemia en el hombre

| | | Agente parasitario | Tipo | Magnitud |
|--------------------------------|-----------|---|----------------|-----------|
| | Protozoos | <i>Entamoeba histolytica</i> <i>Blastocystis hominis</i> | Ferropriva | +++ ++ |
| | Helmintos | <i>Schistosoma haematobium</i> <i>Schistosoma mansoni</i> <i>Schistosoma mekongi</i> <i>Schistosoma japonicum</i> <i>Schistosoma intercalatum</i> | Ferropriva | +++ |
| | | <i>Diphyllobothrium latum</i> <i>Diphyllobothrium pacificum</i> | Megaloblástica | + |
| | | <i>Trichuris trichiura</i> <i>Ascaris lumbricoides</i> | Ferropriva | +++ |
| | | <i>Strongyloides stercoralis</i> | Ferropriva | + |
| | | <i>Ancylostoma duodenale</i> <i>Necator americanus</i> | Ferropriva | ++++ |
| Hemoparásitos e histoparásitos | Protozoos | <i>Plasmodium falciparum</i> <i>Plasmodium vivax</i> <i>Plasmodium malariae</i> <i>Plasmodium ovale</i> | Hemolítica | +++++ |
| | | <i>Babesia bigemina</i> <i>Babesia microti</i> | Hemolítica | ++ |
| | | <i>Toxoplasma gondii</i> | Hemolítica | + |

+ Leve; ++ Moderada; +++ Severa.